


Episode

X-6

Data

[患　部]	右肺
[バイタル]	99(99)
[手術時間]	05:00:00
[超執刀]	使用可能



6戦目はシゲー。序盤で膿の発生回数をできるだけ減らす、潜伏したシゲーを素早く露出させる、の2点に注意して術式を進め、高ランク獲得に挑戦しよう。

The patient's Life is in your hands !

1 **開創** EX 04:58:08
胸部を消毒して切開(切開→P34)

2 **右肺の処置1** EX 04:43:96
膿×3を吸引し、裂傷×4を縫合
(膿→P41、裂傷→P33)

3 炎症(大)×2、炎症(小)×2に消炎剤(青色の液体)を投与して沈静化させる(炎症→P41)

4 バイタルを99まで回復し、残していた裂傷を縫合
(バイタル回復→P33、裂傷→P33)

5 **右肺の処置2** EX 02:39:69
裂傷×4を縫合(裂傷→P33)

6 シゲーを特定して露出させる(シゲー→P53)

7 マイクに息を吹きかけて霧を吹き飛ばしつつ、バイタルを回復
(シゲー→P53、バイタル回復→P33)

8 追加トレイにある人工膜をガス噴出口に乗せて定着させる(シゲー→P53)

9 シゲーが内出血を生み出した場合、内出血を切開し、血だまりを吸引して切開口を縫合
(内出血→P39)

10 膿が発生した場合は吸引し、炎症が発生した場合は消炎剤(青色の液体)を投与して沈静化させる(膿→P41、炎症→P41)

11 シゲー露出時に発生した切開口を治療しつつ、シゲー×3の動きを止める(シゲー→P53)

12 黒色のダミーに触れないように本物のシゲーにダメージを与える(シゲー→P53)

13 潜伏したシゲーを特定して露出させる
(シゲー→P53)

14 7～12の手順でシゲーにダメージを与える
(シゲー→P53)

15 潜伏したシゲーを特定して露出させる
(シゲー→P53)


16 マイクに息を吹きかけて霧を吹き飛ばしつつ、バイタルを回復
(シゲー→P53、バイタル回復→P33)




2
傷をひとつ残しておけばシゲー戦に進むことはない。残した裂傷以外を治療したらバイタルを回復しよう。



3
注射器目一杯まで消炎剤を吸引すれば、炎症(小)2個と(大)1個を治療できる。まとめて治療したい。




8
ガス噴射口は血だまりが発生するまえに人工膜で治療。7-4よりも血だまりの発生が遅くなっている。




9
露出しているシゲーは膿しか生成しない。シゲーを露出させたら、まずはほかの病巣の処置を行なうといい。



10
ほかの病巣を治療するときは、シゲーにヒールゼリーを塗って動きを止めておけば、より安全だ。



12
ダミーにメスを入れると「Miss」になる。動きを止めるときは本物のシゲーと重ならないようにしたい。



13
これまでと同様に、潜伏した地点に素早くエコーを使い、シゲーの影を表示させたら一気にメスを入れよう。

17 シゲー露出時に発生した切開口を治療しつつ、シゲー×4の動きを止める(シゲー→P53)

18 追加トレイにある人工膜をガス噴出口に乗せて定着させる(シゲー→P53)

19 シゲーが内出血を生み出した場合、内出血を切開し、血だまりを吸引して切開口を縫合
(内出血→P39)

20 バイタルを75付近まで回復
(バイタル回復→P33)

21 シゲーが移動するルートにある膿を吸引しつつ、シゲー×4の動きを止める
(膿→P41、シゲー→P53)

22 黒色のダミーに触れないように本物のシゲーにダメージを与える(シゲー→P53)

23 15、16の手順でシゲーを露出させ、21、22の手順でシゲー×4の動きを止めたらシゲー本体にダメージを与える(シゲー→P53)

24 15～22の手順でシゲー×4の動きを止めて　シゲー本体にダメージを与える
(シゲー→P53)

25 15～22の手順でシゲー×4の動きを止め、シゲー本体にダメージを与えて消滅させる
(シゲー→P53)


26 ガス噴射口の血だまりを吸引し、追加トレイにある人工膜を乗せて定着させる(シゲー→P53)

27 残っている膿をすべて吸引し、発生している炎症に消炎剤(青色の液体)を投与して沈静化させる
(膿→P41、炎症→P41)

28 切開口を治療(シゲー→P53)

29 **閉創** EX 02:22:54
切開した部位の閉創処置を行なう
(閉創→P35)


The patient is saved !



20 1
膿を生み出されてもバイタル回復を優先。注射器が使用不可になったらヒールゼリーで時間を稼ごう。



20 2
膿は6個以上増えることはない。吸引してもすぐに増えるので、バイタル回復中は吸引処置をやめよう。



21
膿の下にシゲーが隠れるとメスを入れられないため、膿を吸引しつつ、臓器にヒールゼリーを塗ろう。



23 1
ここからガス噴出口の血だまり発生タイミングが早くなる。血だまりが発生してから処置したほうが安全だ。



23 −2 / 24
バイタルの回復は60程度までにしておき、60近くなったら膿を吸引しつつ、シゲーにダメージを与えよう。



25
6回目の攻撃でシゲーは消滅する。このときはシゲーを露出させたら素早く本体を攻撃したほうがいい。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	獲得スコア
1	超執刀を使用しない	100
2	Miss 判定無し	500
3	120 秒以上残して手術終了　※	700
4	膿の発生回数が 23 回以下	700

※分表示では、2:00

OPERATION RANK

ランク	スコア
C	5200 未満
B	5200 ～ 6199
A	6200 ～ 6799
S	6800 ～ 7199
XS	7200 以上

4 Operation Guide